

AM5 2010: Tracce delle lezioni- 6

LO SPAZIO L^∞ : DUALITÀ E COMPATTEZZA DEBOLE*

Sia μ misura su X . $L^\infty = L^\infty(X, \Sigma, \mu) :=$

$\{f \mid f \text{ é misurabile ed esiste } c > 0 : |f(x)| \leq c \text{ quasi per ogni } x\}$

e $\|f\|_\infty := \inf\{c \geq 0 : |f(x)| \leq c \text{ q.o. } x\} =$
 $= \|f\|_\infty := \min\{c \geq 0 : |f(x)| \leq c \text{ q.o. } x\}$, perché

$$\mu(\{x : |f(x)| > \|f\|_\infty\}) = \mu\left(\cup_n \{x : |f(x)| > \|f\|_\infty + \frac{1}{n}\}\right) = 0$$

É facile vedere che $(L^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ é un **Banach**.

L^∞ é il duale di L^1

Se μ é σ -finita, allora $(L^1)'$ é isometricamente isomorfo a L^∞

TEOREMA DELLA MEDIA.

Sia $g \in L^1$. Se $m \leq \frac{1}{\mu(E)} \int_E g \leq M \quad \forall E \in \Sigma$ con $0 < \mu(E) < +\infty$, allora

$$m \leq g \leq M \quad \text{q.o.}$$

Prova. $\int |g| < +\infty \Rightarrow \mu(\{x : g(x) \geq M + \frac{1}{n}\}) < \infty$ ed allora é anche $\mu(\{x : g(x) \geq M + \frac{1}{n}\}) = 0$ perché, se no,

$$M \geq \frac{1}{\mu(\{x : g(x) \geq M + \frac{1}{n}\})} \int_{\{x: g(x) \geq M + \frac{1}{n}\}} g \geq M + \frac{1}{n}$$

Dunque $\mu(\{x : g(x) > M\}) = \mu(\cup_n \{x : g(x) \geq M + \frac{1}{n}\}) = 0$. Ugualmente $\mu(\{x : g(x) < m\}) = 0$.

Prova del Teorema di isomorfismo. Data $g \in L^\infty$, sia

$$T(g) := l_g, \quad l_g(f) = \int fg \quad \forall f \in L^1. \quad \text{É } |l_g(f)| = \left| \int fg \right| \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$$

Dunque l_g é un funzionale lineare e continuo su L^1 con

$$\|l_g\| \leq \|g\|_\infty$$

T **é isometria** (chiaramente lineare). Si tratta di provare che $\|l_g\| \geq \|g\|_\infty$.
 Sia $X = \cup_j E_j$, $E_j \subset E_{j+1}$, $\mu(E_j) < +\infty$. Allora $g_j := g\chi_{E_j} \in L^1$.

É $\left| \frac{1}{\mu(E)} \int_E g_j \right| = \left| \frac{1}{\mu(E)} \int g \chi_{E \cap E_j} \right| = \frac{l_g(\chi_{E \cap E_j})}{\mu(E)} \leq \frac{\|l_g\| \mu(E \cap E_j)}{\mu(E)} \leq \|l_g\|$ e quindi, per il Teorema della Media, $\|g_j\|_\infty \leq \|l_g\|$ e quindi $\|g\|_\infty \leq \|l_g\|$.

T **é suriettiva**. Sia $X = \cup_j E_j$, $E_i \cap E_j = \emptyset$, $\mu(E_j) < +\infty$. Dato $l \in (L^1)'$, sia $l_j(f) := l(f\chi_{E_j})$. Da

$$|l_j(f)| \leq \|l\| \|f\chi_{E_j}\|_1 \leq \|l\| \sqrt{\mu(E_j)} \|f\|_2 \quad \forall f \in L^2$$

segue che l_j é lineare e continuo su L^2 e quindi

$$\exists g_j \in L^2 : \quad l(f\chi_{E_j}) = l_j(f) = \int f g_j \quad \forall f \in L^2$$

Allora, presa $f = \chi_{E_i} \text{sign } g_j$, si ha che, se $i \neq j$, $0 = l(\chi_{E_i} \text{sign } g_j \chi_{E_j}) = \int_{E_i} |g_j|$ e quindi $g_j = 0$ q.o. in E_j^c . In particolare $g_j \in L^1$ e quindi, dal teorema della media e

$$\left| \frac{1}{\mu(E)} \int_E g_j \right| = \frac{l(\chi_{E \cap E_j})}{\mu(E)} \leq \|l\|$$

segue che $g_j \in L^\infty$. Ora, se $f \in L^1$, allora $f|_{E_j}$ é approssimabile in $L^1(E_j)$ mediante funzioni L^2 e quindi, dalla limitatezza di g_j e dalla continuitá di l segue che

$$l(f\chi_{E_j}) = l_j(f) = \int f g_j \quad \forall f \in L^1$$

Infine, siccome $\sum_{j=1}^n f\chi_{E_j}$ converge a f in L^1 , dalla continuitá di l segue che

$$l(f) = \sum_j l(f\chi_{E_j}) = \sum_j \int f g_j = \int f \left(\sum_j g_j \right)$$

ove $\|\sum_j g_j\|_\infty \leq \|l\|$.

Il duale di L^∞ non é L^1

Data $g \in L^1(X, \mu)$, sia $l_g(f) := \int_X f g d\mu$, $f \in L^\infty$. $L(g) := l_g$ é isometria lineare di L^∞ in $(L^\infty)'$, ma **non** é, in generale, suriettiva.

Da $|l_g(f)| \leq \|g\|_1 \|f\|_\infty$, segue che $l_g \in (L^\infty)'$ e $\|Lg\|_\infty \leq \|g\|_1$: L é operatore lineare continuo di L^1 in $(L^\infty)'$. Di piú, presa $f = \text{sign } g$, $\|l_g\| \geq \|g\|$. Controesempio. Se

$$l(\varphi) := \varphi(0) \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbf{R}^N)$$

l é funzionale lineare continuo su C_0^∞ , e, per il Teorema di Hahn-Banach, l ha un prolungamento lineare e continuo su tutto L^∞ , che indichiamo ancora con l . Se esistesse $g \in L^1$ tale che $l(f) = \int g f$, $\forall f \in L^\infty$ sarebbe

$$\varphi(0) = \int g(x)\varphi(nx)dx \rightarrow_n 0 \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbf{R}^N) \quad ; \quad \text{contraddizione se } \varphi(0) \neq 0.$$

Convergenza debole in L^1 . Siano $f_n \in L^1$.

$$f_n \rightharpoonup f \quad \text{in } L^1 \quad \Leftrightarrow \quad \int (f_n - f)h \rightarrow 0 \quad \forall h \in L^\infty$$

Convergenza debole in L^∞ . Siano $f_n \in L^\infty$.

$$f_n \rightharpoonup f \quad \text{in } L^\infty \quad \Leftrightarrow \quad l(f_n) \rightarrow l(f) \quad \forall l \in (L^\infty)'$$

Convergenza debole* in L^∞ . Siano $f_n \in L^\infty$.

$$f_n \rightharpoonup^* f \quad \text{in } L^\infty \quad \Leftrightarrow \quad \int f_n h \rightarrow \int f h \quad \forall h \in L^1$$

NOTA. Diversamente da quanto accade in $L^p, p \in (1, +\infty)$, **successioni limitate in L^1 o in L^∞ non hanno, in generale, estratte debolmente convergenti.**

(i) Sia $f \in C_0^\infty(\mathbf{R}^N), f \geq 0, \int f = 1, f_n(x) := n^N f(nx)$. É $\int_{\mathbf{R}^N} |f_n| dx = \int_{\mathbf{R}^N} |f|$.

Supponiamo che esistano $\hat{f} \in L^1$ ed f_{n_k} tali che $\int f_{n_k} g \rightarrow \int \hat{f} g \quad \forall g \in C_0^\infty$. Quindi

$$\int \hat{f} g = \lim_k \int_{\mathbf{R}^N} f_{n_k}(x)g(x)dx = \lim_k \int_{\mathbf{R}^N} f(y) g\left(\frac{y}{n_k}\right)dy = g(0) \quad \forall g \in C_0(\mathbf{R}^N)$$

e quindi $g(0) = \int_{\mathbf{R}^N} \hat{f}(x)g(x)dx \rightarrow_j 0$ che é assurdo se $g(0) \neq 0$.

(ii) Siano $f_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt), t \in [0, 2\pi]$. Tali funzioni formano un sistema ortonormale in $L^2([0, 2\pi])$ e quindi convergono debolmente a zero in L^2 . Di piú, si ha

Lemma (Riemann-Lebesgue) $f_n \rightharpoonup^* 0: \int_0^{2\pi} \sin(nt) g(t)dt \rightarrow_n 0 \quad \forall g \in L^1$

La successione f_n non ha però estratte debolmente convergenti in L^∞ . Segue da

1. Se $\phi_n \in C([0, 2\pi])$ tende debolmente a zero in L^∞ allora $\phi_n(t) \rightarrow_n 0 \quad \forall t$.
2. Ogni sottosuccessione f_{n_k} converge al piú su un insieme di misura nulla.

Il fatto 1. si vede considerando $l_t(\phi) := \phi(t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Tale l_t é funzionale lineare e continuo (rispetto alla norma del sup) su $C([0, 2\pi])$, ed é quindi, per Hahn-Banach, restrizione di un $l \in (L^\infty)'$. Ovviamente $l_t(\phi_n) \rightarrow_n 0 \Leftrightarrow \phi_n(t) \rightarrow_n 0$.

Il fatto 2. segue da Riemann-Lebesgue ed é lasciato come esercizio.

Compattezza debole* (Teorema di Banach-Alaoglu). *Siano μ σ -finita ed $L^1(\mu)$ separabile. Allora*

$$\sup_n \|f_n\|_\infty < +\infty \Rightarrow \exists n_k, f \in L^\infty : \quad f_{n_k} \rightharpoonup^* f$$

Infatti : $\sup_n \int f_n h \leq (\sup_n \|f_n\|_\infty) \|h\|_1 \quad \forall h \in L^1 \Rightarrow$ (procedimento diagonale di Cantor !) $\exists n_k : \quad l(h) := \lim_k \int f_{n_k} h$ esiste finito $\quad \forall h \in D \subset L^1$ numerabile e denso; l si prolunga in modo lineare e continuo a tutto L^1 e quindi

$$\exists g \in L^\infty : \quad \lim_k \int f_{n_k} h = l(h) = \int gh \quad \forall h \in D$$

e quindi (in modo standard) $\lim_k \int f_{n_k} h = \int gh \quad \forall h \in L^1$.

Funzionali lineari continui e misure. Sia $l \in (L^\infty(X, \Sigma, \mu))'$. Allora

$$\exists g \in L^1 : \quad l(f) = \int fgd\mu \quad \forall f \in L^\infty \Leftrightarrow (f_n \rightharpoonup^* 0 \Rightarrow l(f_n) \rightarrow 0)$$

\Rightarrow . Ovvio. \Leftarrow . Proviamolo nell'ipotesi aggiuntiva $f \geq 0 \Rightarrow l(f) \geq 0$. In tal caso $\mu_l(E) := l(\chi_E)$, $E \in \Sigma$ é misura perché $E_j \in \Sigma$, $E_i \cap E_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \Rightarrow \chi_{\cup_{j \geq n+1} E_j} \rightarrow_n 0 \quad \forall x \Rightarrow \int \chi_{\cup_{j \geq n+1} E_j} h \rightarrow_n 0 \quad \forall h \in L^1 \Rightarrow l(\chi_{\cup_{j \geq n+1} E_j}) \rightarrow_n 0 \Rightarrow$

$$\mu_l(\cup_{j=1}^\infty E_j) = \sum_{j=1}^n l(\chi_{E_j}) + l(\chi_{\cup_{j \geq n+1} E_j}) = \sum_{j=1}^n \mu_l(E_j) + l(\chi_{\cup_{j \geq n+1} E_j}) \rightarrow_n \sum_{j=1}^\infty \mu_l(E_j)$$

Ora, per linearitá, $l(\varphi) = \int \varphi d\mu_l$ se $\varphi = \sum_{j=1}^n c_j \chi_{E_j}$.

Poi, se $0 \leq \varphi_j \leq f \in L^\infty(\mu)$ tende puntualmente ed in modo monotono a f , é $\int \varphi_j d\mu_l \rightarrow_j \int f d\mu_l$. Ma, per Lebesgue, é anche $\int \varphi_j h d\mu \rightarrow \int f h d\mu \quad \forall h \in L^1(\mu)$ e quindi $\int \varphi_j d\mu_l = l(\varphi_j) \rightarrow_j l(f)$. Quindi $\int f d\mu_l = l(f)$ e, scrivendo $f = f^+ - f^-$,

$$l(f) = \int f d\mu_l \quad \forall f \in L^\infty(\mu)$$

Infine, $\mu(E) = 0 \Rightarrow \nu_l(E) = l(\chi_E) = 0$, ed il fatto che esista $g \in L^1(\mu)$ tale che $\int f d\mu_l = \int fgd\mu \quad \forall f \in L^\infty(\mu)$ é conseguenza del seguente Teorema di Radon-Nikodym.

Esercizi e problemi 6

Esercizio 1.

Provare che l^∞ non é separabile.

Esercizio 2. Trovare una successione $l_n \in (l^\infty)'$ limitata, che non ha estratte debolmente* convergenti.

Esercizio 3. Sia $c_0 := \{x \in l^\infty : x(j) \rightarrow_j 0\}$.

Provare che c_0 é sottospazio lineare chiuso di l^∞ e che

$$\forall a \in l^\infty, \quad \exists a_n \in c_0 : \quad a_n \rightharpoonup^* a$$

(non é in particolare vero che $x_n \in C \subset l^\infty$ chiuso e convesso, $x_n \rightharpoonup^* x$ in $l^\infty \Rightarrow x \in C$).

Esercizio 4. Sia $h \in l^1$. Posto

$$l_h(x) := \int_{\mathbf{N}} h x = \sum_j h(j) x(j) \quad \forall x \in c_0$$

provare che $Lh := l_h$ é una isometria lineare suriettiva di l^1 su $(c_0)'$ (l^1 é il duale di c_0 ...ma c_0 non é il duale di l^1 !).

Esercizio 5.

Mostrare con un esempio che non tutte le successioni limitate in c_0 hanno estratte debolmente convergenti.

Esercizio 6. Provare che

$$x_n \in l^1, \quad x_n \rightarrow_n x \quad \Rightarrow \quad \|x_n - x\|_1 \rightarrow_n 0$$

Esercizio 7. Sia f misurabile. Provare che

(i) $\sup_{p \geq 1} \|f\|_p < +\infty \quad \Rightarrow \quad f \in L^\infty$

(ii) $f \in L^1 \cap L^\infty \quad \Rightarrow \quad f \in L^p \quad \forall p > 1$ e $\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty$

CENNI DI SOLUZIONI

Esercizio 1. Sia $A := \{x : \mathbf{N} \rightarrow \{0, 1\}\} = 2^{\mathbf{N}}$. Come noto, A non é numerabile (ha la potenza del continuo). Siccome

$$x, y \in A, \quad x \neq y \quad \Rightarrow \quad \|x - y\|_{\infty} = 1$$

esiste in l^{∞} una famiglia non numerabile di palle disgiunte: un insieme denso in l^{∞} , dovendo intersecare ciascuna di tali palle, non può dunque essere numerabile.

Esercizio 2. Sia $l_n(x) := x(n) \quad \forall x \in l^{\infty}$. É

$$|l_n(x)| = |x(n)| \leq \sup_j |x(j)| = \|x\|_{\infty} \quad \text{e quindi} \quad \|l_n\| = 1$$

(infatti, se $e_n(j) := 0$ se $j \neq n$ e $e_n(n) := 1$, allora $l_n(e_n) = 1$).

Siccome

$$l_{n_k} \rightarrow^* l \quad \Leftrightarrow \quad x(n_k) = l_{n_k}(x) \rightarrow l(x)$$

implica, in particolare, che $x(n_k)$ converge, tale l non può esistere perché, quale che sia la selezione n_k esiste una successione limitata x tale che la $k \rightarrow x(n_k)$ non converga.

Esercizio 3. (i) Chiaramente,

$$x_n(j) \rightarrow_j 0 \quad \forall n, \quad \sup_j |x_n(j) - x(j)| \rightarrow_n 0 \quad \Rightarrow$$

$$|x(j)| \leq |x(j) - x_n(j)| + |x_n(j)| \leq 2\epsilon$$

se $n = n_{\epsilon}$ é abbastanza grande e $j \geq j(n_{\epsilon})$, ovvero $x \in c_0$ e quindi c_0 é chiuso in l^{∞} .

Ricordiamo qui che, pensato \mathbf{N} munito della misura che conta, i corrispondenti L^p si indicano l^p . In particolare, l^{∞} é il duale di l^1 :

$$\forall h \in l^{\infty}, \quad l_h(x) := \int_{\mathbf{N}} h x = \sum_{j=1}^{\infty} h(j) x(j) \quad \forall x \in l^1, \quad \text{e} \quad Lh := l_h$$

é isometria lineare suriettiva di l^{∞} su $(l^1)'$.

Esempio: se $b_n := \chi_{\{1, \dots, n\}}$, $b_n \in c_0$ e $l_{b_n}(x) := \int_{\mathbf{N}} b_n x = \sum_{j=1}^n x(j) \quad \forall x \in l^1$. Si ha $l_{b_n}(x) \rightarrow_n \sum_{j=1}^{\infty} x(j) = \int_{\mathbf{N}} x = l_{\chi_{\mathbf{N}}}$ ovvero $b_n \rightarrow^* \chi_{\mathbf{N}} \notin c_0$. Più in

generale, $\forall a \in \mathbf{N}$ e posto $a_n := a b_n$, risulta

$$l_{a_n}(x) = \sum_j x(j) a_n(j) = \sum_{j=1}^n x(j) a(j) \rightarrow_n \sum_{j=1}^{\infty} x(j) a(j) = l_a(x) \quad \forall x \in l^1$$

ovvero $a_n \rightarrow^* a$ in l^∞ .

(ii) Se, per $h \in l^1$, $Lh := l_h$, $l_h(x) := \sum_j h(j) x(j)$, Lh é funzionale lineare e continuo su l^∞ e quindi anche su c_0 con $\|l_h\| = \|h\|_1$ perché $|l_h(x)| \leq \|x\|_\infty \sum_j |h(j)|$ e, viceversa, posto $x_n(j) := \text{sign } h(j) b_n(j)$ risulta $x_n \in c_0$, $\|x_n\|_\infty = 1$ e quindi $\|l_h\| \geq l_h(x_n) = \sum_{j=1}^n |h(j)| \quad \forall n$.

Suriettività di L . Sia $l \in (c_0)'$ e, posto $e_n := \chi_{\{n\}} \in c_0$, sia $h := (l(e_j))_{j \in \mathbf{N}}$. Intanto, $h \in l^1$, perché

$$\sum_{j=1}^n |h(j)| = l\left(\sum_{j=1}^n \text{sign } h(j) e_j\right) \leq \|l\| \left\| \sum_{j=1}^n \text{sign } h(j) e_j \right\|_\infty \leq \|l\| \Rightarrow$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} |h(j)| \leq \|l\| < \infty$$

Infine $\|x - b_n x\|_\infty = \sup_{j \geq n+1} |x(j)| \rightarrow_n 0 \quad \forall x \in c_0 \Rightarrow$

$$l(x) = \lim_n l(x b_n) = \lim_n \left[\sum_{j=1}^n l(x(j) e_j) \right] = \sum_{j=1}^{\infty} x(j) l(e_j) = l_h(x)$$

Esercizio 4.

Come in (ii) dell'esercizio 3: $b_n := \chi_{\{1, \dots, n\}} \rightarrow^* \chi_{\mathbf{N}} \notin c_0$.

In particolare, $l_{b_n}(e_j) \rightarrow_n 1 \quad \forall j$.

Esercizio 5. Per assurdo (passando eventualmente ad una sottosuccessione)

$\exists x_n \rightarrow 0$ in l^1 tale che $\|x_n\|_1 \geq \delta > 0$, e quindi, sostituendo x_n con $\frac{x_n}{\|x_n\|_1}$

$$\exists x_n \rightarrow 0 \quad \text{con} \quad \|x_n\|_1 = 1 \quad \forall n \in \mathbf{N}$$

Da $x_n \rightarrow 0$ ovvero $\sum_j x_n(j) a(j) \rightarrow_n 0 \quad \forall a \in l^\infty$ segue, prendendo $a = \chi_{\{i\}}$,

$$x_n(i) \rightarrow_n 0 \quad \forall i \in \mathbf{N}$$

Quindi, per ogni fissato $m \in \mathbf{N}$, $\sum_{j>m} |x_n(j)| > \frac{3}{4} \quad \forall n \geq n_m$

Siano poi $k_1 < l_1$ tali che $\sum_{j=k_1}^{l_1} |x_1(j)| \geq \frac{3}{4}$.

Detto $n_1 = 1$, sia n_2 tale che se $k_2 > l_1$ ed $l_2 > k_2$ é abbastanza grande risulti

$$\sum_{j=k_2}^{l_2} |x_{n_2}(j)| \geq \frac{3}{4}$$

Iterando, si costruisce una sottosuccessione x_{n_i} tale che, se $k_i > l_{i-1}$ ed l_i é abbastanza grande risulti

$$\forall i \in \mathbf{N} : \quad \sum_{j=k_i}^{l_i} |x_{n_i}(j)| \geq \frac{3}{4} \quad \text{e quindi} \quad \sum_{j < k_i} |x_{n_i}(j)| + \sum_{j > l_i} |x_{n_i}(j)| \leq \frac{1}{4}$$

Se $a(j) = \text{sign } x_{n_i}(j) \quad \forall j = k_i, \dots, l_i$, é $a \in l^\infty$ e quindi $\sum_j x_{n_i}(j) a(j) \rightarrow_i 0$

$$\text{mentre} \quad \sum_j x_{n_i}(j) a(j) \geq \sum_{j=k_i}^{l_i} |x_{n_i}(j)| - \left[\sum_{j < k_i} |x_{n_i}(j)| + \sum_{j > l_i} |x_{n_i}(j)| \right] \geq \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

contraddizione.

Esercizio 6.

(i) Sia $\mu(\{x : |f(x)| \geq c\}) > 0$. Allora

$$\begin{aligned} \sup_{p \geq 1} \int |f|^p &\geq \left(\int_{\{x: |f(x)| \geq c\}} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \geq c \mu(\{x : |f(x)| \geq c\})^{\frac{1}{p}} \Rightarrow \sup_{p \geq 1} \int |f|^p &\geq \\ &\geq c \limsup_{p \rightarrow +\infty} \mu(\{x : |f(x)| \geq c\})^{\frac{1}{p}} = c \Rightarrow \mu(\{x : |f(x)| \geq c\}) = 0 \end{aligned}$$

se $c > \sup_{p \geq 1} (\int |f|^p)^{\frac{1}{p}}$ e quindi $\|f\|_\infty \leq \sup_{p \geq 1} (\int |f|^p)^{\frac{1}{p}}$

(ii) $p > 1 \Rightarrow \int |f|^p = \int |f| |f|^{p-1} \leq \|f\|_1 \|f\|_\infty^{p-1}$

$$\Rightarrow \|f\|_p \leq \|f\|_1^{\frac{1}{p}} \|f\|_\infty^{\frac{p-1}{p}} \Rightarrow \limsup_{p \rightarrow +\infty} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty$$

Poi, $c < \|f\|_\infty \Rightarrow \mu(\{x : |f(x)| \geq c\}) > 0$ ed allora

$$\|f\|_p \geq c \mu(\{x : |f(x)| \geq c\})^{\frac{1}{p}} \Rightarrow \liminf_{p \rightarrow +\infty} \|f\|_p \geq c \Rightarrow \liminf_{p \rightarrow +\infty} \|f\|_p \geq \|f\|_\infty$$