

## IV tutorato di Analisi Matematica 1A

Gabriele Nocco      Stefano Urbinati

17 ottobre 2005

**Esercizio 1.** Verificare quale tra le seguenti è una distanza in  $\mathbb{R}$ :

a)  $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$

La distanza è una funzione da  $\mathbb{R}$  a  $\mathbb{R}^2$  che verifica le seguenti proprietà:

- $d(x, y) \geq 0 \quad \wedge \quad d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$   
-In questo primo caso che la distanza sia  $\geq 0$  è ovvio perchè la radice è definita positiva.  $\sqrt{|x - y|}$  sarà uguale a 0  $\Leftrightarrow |x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$ . OK! La prima proprietà è verificata!!!
- $d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$   
-Per la seconda proprietà sfruttiamo quello che conosciamo sui moduli:  $d(x, y) = \sqrt{|x - y|} = \sqrt{|-(x - y)|} = \sqrt{|y - x|} = d(y, x)$ . OK!
- (disuguaglianza triangolare)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(x, z) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}$   
-Devo verificare se  $\sqrt{|x - y|} \leq \sqrt{|x - z|} + \sqrt{|z - y|} \Rightarrow$  facendo i quadrati ottengo  $|x - y| \leq |x - z| + |z - y| + 2\sqrt{|x - z|}\sqrt{|z - y|}$ . Se verifico la disuguaglianza che ho appena ottenuto ho finito... Poichè  $|x - y| = |x - z + z - y| \leq |x - z| + |z - y| \leq |x - z| + |z - y| + 2\sqrt{|x - z|}\sqrt{|z - y|}$ . OK!!  
*Questa è una distanza!!*

b)  $d(x, y) = |x^2 - y^2|$       Non vale la prima proprietà, non è una distanza!

*N.B. Perchè sia una distanza la funzione deve verificare tutte le proprietà quindi appena una non è verificata potete concludere senza verificare le altre...*

c)  $d(x, y) = |x - y|^2$       Non vale la disuguaglianza triangolare, non è una distanza.

d)  $d(x, y) = |\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}|$       Non vale la prima proprietà, non è una distanza.

e)  $d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{se } x = y \end{cases}$       È una distanza!

**Esercizio 2.** Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false e motivare la risposta:

Sia  $E$  un insieme non vuoto di numeri reali.

- a)  $l$  è estremo inferiore per  $E$  se  $l$  è un minorante di  $E$  ed è tale che  $\forall x \in E, \exists \epsilon > 0$  per cui risulta  $x < l + \epsilon$
- b) L'intervallo  $[a, +\infty)$  risulta chiuso in  $\mathbb{R}$ , mentre l'insieme  $[a, b)$  non è nè aperto nè chiuso.

**Soluzione 1.** a) L'affermazione è falsa. Facciamo un controesempio:

sia il nostro insieme di partenza  $(0, 1)$  il cui estremo inferiore è ovviamente 0; consideriamo  $l = -1$ .  $l$  è un minorante per l'insieme e per ogni  $x \in (0, 1)$ , scegliendo  $\epsilon = 3$ , ottengo che  $l + \epsilon > x$  pur non essendo  $-1$  un estremo inferiore.

- b) Consideriamo il secondo insieme. Utilizziamo la definizione con i punti di accumulazione (un insieme è chiuso se contiene tutti i suoi punti di accumulazione). Ovviamente  $b$  è di accumulazione e non è contenuto nell'insieme quindi l'insieme non è chiuso. Per vedere se è aperto, verifichiamo se il complementare è chiuso. Il complementare è  $(-\infty, a) \cup [b, \infty)$ , dove  $a$  è punto di accumulazione ma non è contenuto nell'insieme, quindi  $[a, b)$  non è neanche aperto!

**Esercizio 3.** Trovare, qualora esistano, estremo superiore e inferiore dei seguenti insiemi e dire se sono rispettivamente un massimo e un minimo per lo stesso insieme. Motivare le risposte verificandole attraverso la caratterizzazione.

a)  $E = \{x \in [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] : x = \frac{m}{2^n}, n, m \in \mathbb{N}\}$

Sol:  $\min = \inf = \frac{1}{2}, \max = \sup = \frac{2}{3}$

b)  $E = \{x \in \mathbb{R} : x = \frac{3n-2}{2^n}, n \in \mathbb{N}\}$

Sol:  $\min = \inf = \frac{1}{2}, \sup = \frac{3}{2}$

c)  $E = \{x \in \mathbb{R} : x = \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}\}$

Sol:  $\min = \inf = -1, \max = \sup = \frac{1}{2}$

**Esercizio 4.** Dimostrare che ogni insieme  $A$ , chiuso e limitato, ha Massimo e Minimo.

**Esercizio 5.** Dato l'insieme  $A = \{a_n \in \mathbb{R} : a_n = (-1)^n \frac{n}{n+3}, n \in \mathbb{N}\}$  determinare,  $\sup A, \inf A$ .

**Esercizio 6.** Dimostrare che dati due insiemi qualunque  $X, Y \neq \emptyset$ ,  $Y \subseteq X \subseteq \mathbb{R}$ , si ha

$$\inf X \leq \inf Y \leq \sup Y \leq \sup X.$$

**Esercizio 7.** Dimostrare che dati due insiemi qualunque  $X, Y \neq \emptyset$ , se  $X + Y := \{x + y, x \in X, y \in Y\}$ , si ha:

$$\sup(X + Y) = \sup X + \sup Y$$

soluzione: Per ogni  $y \in Y$   $y \leq \sup Y$  e  $y \geq \inf Y$ , pertanto da  $\inf Y \leq y \leq \sup Y$  segue che  $\inf Y \leq \sup Y$ . D'altra parte, poichè  $Y \subseteq X$ ,  $\sup X$  è un maggiorante per  $Y$ , quindi  $\sup X \geq y \forall y \in Y$ , e allora  $\sup X \geq \sup Y$  dato che  $\sup Y$  è il più piccolo dei maggioranti. Analogamente si dimostra che  $\inf X \leq \inf Y$ .

**Esercizio 8.** Sia  $X \in \mathbb{R}$ ,  $X \neq \emptyset$  e sia  $tX := \{tx : x \in X, t \in \mathbb{R}^+\}$ , allora si ha

$$\sup(tX) = t \sup X$$

**Esercizio 9.** Dimostrare che un insieme  $X \in \mathbb{R}$  e' limitato  $\iff$  esiste un numero reale  $M > 0$  tale che  $|x| < M, \forall x \in X$ .